

**ISTRUZIONI PER L'ESECUZIONE DI
 AGOBIOPSIA PROSTATICA TRANS-RETTALE ECOGUIDATA**

Per il medico curante e per il paziente

**IL PAZIENTE È INVITATO AD ATTENERSI SCRUPOLOSAMENTE ALLE
 NORME SOTTORIPORTATE**

La biopsia prostatica viene eseguita in regime ambulatoriale. È preferibile la presenza di un accompagnatore per l'eventuale impossibilità alla guida di veicoli nelle ore successive all'indagine.

Segnalare sempre all'Urologo eventuali allergie a farmaci, anestetici locali, lattice e l'eventuale assunzione di farmaci antiaggreganti o anticoagulanti che diminuiscono la capacità di coagulazione del sangue (es. Aspirina, Tiklid, Persantin, Eparina, Coumadin, Sintrom, etc.)

Il paziente in trattamento anticoagulante o antiaggregante (Coumadin, Aspirina ecc.) dovrà sospendere la terapia secondo le indicazioni del centro di riferimento o seguendo il seguente schema:

- **terapia con TICLOPIDINA o ACIDO ACETILSALICILICO (Aspirina):**
sospendere 7 giorni prima
- **terapia con COUMADIN o SINTROM:** sospendere 7 giorni prima e sostituire con **SELEPARINA 0,3 1 fiala sottocute.**

Il paziente affetto da condizioni cardiache a rischio di sviluppare endocardite batterica, oltre alla profilassi specifica per la procedura, deve seguire lo schema di profilassi a pag. 2.

In caso di mancata esecuzione delle istruzioni sotto-riportate, l'esame dovrà essere necessariamente posticipato.

1. La SERA PRECEDENTE all'esame, assumere una cena leggera ed eseguire un clistere evacuativo di pulizia con un litro di acqua tiepida. Assumere 1 compressa di antibiotico LEVOFLOXACINA 500 mg.

2. Il GIORNO DELL'ESAME assumere una colazione a base di soli liquidi (the, latte, ecc.). Ripetere a domicilio il clistere evacuativo (se necessario). Assumere 1 compressa di antibiotico LEVOFLOXACINA 500 mg.

Presentarsi all'ora indicata, presso l'Ufficio Cassa muniti di:

PRESTAZIONE IN REGIME SSN	PRESTAZIONE IN REGIME LIBERA PROFESSIONE
- Impegnativa SSN del Medico Curante con la dicitura: cod. 60.11 AGOBIOPSIA ECOGUIDATA DELLA PROSTATA	Richiesta dello Specialista con la seguente dicitura: AGOBIOPSIA ECOGUIDATA DELLA PROSTATA+ESAME ISTOLOGICO DI BIOPSIA PROSTATICA
- Impegnativa SSN del Medico Curante con la dicitura: cod. 91. 44.1 ESAME ISTOLOGICO DI BIOPSIA PROSTATICA	

**ISTRUZIONI PER L'ESECUZIONE DI
 AGOBIOPSIA PROSTATICA TRANS-RETTALE ECOGUIDATA**

Si ricorda di portare con sé:

- 1. l'esito dei seguenti ESAMI EMATOCHIMICI recenti (eseguiti al massimo 15 giorni prima della biopsia):**
 - **PT** (tempo di protrombina o tempo di Quick)
 - **PTT** (tempo di tromboplastina parziale)
 - **PSA** (antigene prostatico specifico) - ultimo controllo eseguito

Nei casi di pazienti in terapia con Coumadin o Sintrom, il controllo del PT e PTT deve essere effettuato il giorno prima della biopsia.

2. Una bottiglia di acqua (almeno 1,5 l.) al fine di iniziare l'assunzione di abbondanti liquidi sin dall'esecuzione dell'esame e proseguire per i successivi 3 giorni (almeno 2 litri /al giorno)

3. PER I TRE GIORNI SUCCESSIVI ALL'ESAME

Assumere 1 compressa di antibiotico LEVOFLOXACINA 500 mg al giorno.



Dopo la biopsia è consigliabile riposo per 48 ore.

Se non si verificano complicazioni il paziente potrà tornare alle consuete attività dopo due giorni.

In caso di sanguinamento profuso, febbre elevata (maggiore di 38°C), difficoltà ad urinare e in ogni caso di necessità telefonare al n. **0422896562** (Infermiera Danila) dalle 08.00 alle 12.30 (dal lunedì al venerdì) o in reparto di Chirurgia al n. **0422896722**.

PROFILASSI DELL'ENDOCARDITE BATTERICA

Per i pazienti affetti dalle patologie cardiache di seguito elencate sottoposti a determinate procedure tra le quali la biopsia prostatica, è raccomandata la profilassi antibiotica per la prevenzione dell'endocardite batterica come da schema indicato:

Pazienti a rischio elevato di endocardite (pregressa endocardite, portatori di protesi valvolari cardiache, cardiopatie congenite complesse-tetralogia di Fallot e altre forme cianogene complesse, difetto interventricolare, stenosi aortica congenita, bicuspidia aortica.	 Amoxicillina (o ampicillina) 2 g ev + gentamicina 3 mg/kg im o ev 30 min./1 ora prima della procedura. Dopo 6 ore Amoxicillina (o ampicillina) 1 g. X os Nei soggetti allergici Clindamicina 600 mg. 1-2 ore prima della procedura + Gentamicina 3 mg/Kg e.v. o i.m.
Pazienti a rischio moderato/ lieve di endocardite valvulopatie acquisite (malattia reumatica, valvulopatia aortica, insufficienza mitralica), prollasso mitralico con ispessimento, calcificazione o degenerazione mixomatosa dei lembi, insufficienza valvolare, cardiopatie congenite non cianogene, cardiomiopatia ipertrofica	 Amoxicillina (o ampicillina) 2 g ev entro 30 min./ 1 ora prima della procedura, o per via orale 1 ora prima della procedura Nei soggetti allergici Clindamicina 600 mg. 1-2 ore prima della procedura e.v. o i.m.