

## INFORMATIVA STUDIO URODINAMICO INVASIVO

Gentile Signore/a

Lei necessita di essere sottoposto/a alla procedura diagnostica di studio urodinamico. Affinché sia informato/a in maniera chiara e sufficiente sulla procedura che Le è stata proposta, oltre alle informazioni avute nel corso della visita, La preghiamo di leggere con attenzione questo documento. Le notizie che vi sono contenute hanno lo scopo di permetterLe di decidere liberamente e più consapevolmente se effettuare o meno la procedura.

Lo studio urodinamico è un esame ambulatoriale che indaga la funzione vescicale per capire le cause dei suoi sintomi. Le inseriremo dei tubicini morbidi (cateteri) in vescica ed una sonda nel retto. L'esame dura 40-80 minuti e si svolge alla presenza di 1 medico e di 1 infermiere, nel maggior rispetto possibile della sua privacy. Le manovre non sono dolorose ma potrà avere qualche fastidio dopo l'esame per cui è opportuno che beva più del solito nelle 3-4 ore successive.

Ricordi che non verrà sottoposto all'indagine in caso di infezione urinaria in atto.

In caso comparissero, dopo l'esame, sintomi urinari persistenti (bisogno frequente di urinare, bruciori e/o urgenza) o febbre è opportuno assumere una bustina di Monuril a vescica vuota. Qualora i sintomi non si risolvessero contatti il medico dell'Unità Operativa di Urologia ai seguenti numeri telefonici:

- Ricoveri ordinari: 0422/896492-722
  - Day Surgery: 0422/896515
  - Ambulatorio dalle 8.30 alle 12-30: 0422/896562.
- O in alternativa il proprio Medico di base

### COME PRESENTARSI:

- Con un normale desiderio di urinare o con vescica vuota se esegue il cateterismo pulito intermittente
- Non è necessario il digiuno
- La sera precedente l'esame dovrà essere eseguito un microclisma evacuativo
- Porti: 1) la sua documentazione sanitaria 2) l'impegnativa per la prestazione con codice 57.39.20 3) i diari vescicali di 3-4 giorni (vedi allegato) 4) esame urine ed urinocoltura con antibiogramma eseguiti al massimo 15gg prima dell'esame
- Ricordi di segnalare eventuali allergie a farmaci o al lattice al personale sanitario

