

DIPARTIMENTO DI DAY SURGERY

Responsabile Dr. Pasquale Piazzolla

DIPARTIMENTO DI U.F. UROLOGIA

Responsabile Dr. Carmelo Morana

Tel. 0422 896722

ISTRUZIONI PER L' ESECUZIONE DI AGOBIOPSIA PROSTATICA TRANS-RETTALE ECOGUIDATA

Per il medico curante e per il paziente

IL PAZIENTE È INVITATO AD ATTENERSI SCRUPolosAMENTE ALLE NORME SOTTORIPORTATE

La biopsia prostatica viene eseguita in regime ambulatoriale. È preferibile la presenza di un accompagnatore per l'eventuale impossibilità alla guida di veicoli nelle ore successive all'indagine.

Effettuare o portare l'esito dei seguenti ESAMI EMATOCHIMICI (eseguiti al massimo 1 mese prima della biopsia):

- Emocromo
- PT (tempo di protrombina o tempo di Quick)
- PTT (tempo di tromboplastina parziale)
- INR
- PSA (antigene prostatico specifico) - ultimo controllo eseguito

Segnalare sempre all'Urologo eventuali allergie a farmaci, anestetici locali, lattice e l'eventuale assunzione di farmaci antiaggreganti o anticoagulanti che diminuiscono la capacità di coagulazione del sangue (es.

Aspirina, Tiklid, Persantin, Eparina, Coumadin, Sintrom, etc.)

Il paziente in terapia con anticoagulante o antiaggregante (Coumadin, Aspirina ecc.) dovrà sospendere la terapia secondo le indicazioni del centro di riferimento o seguendo il seguente schema:

- **TICLOPIDINA:** sospendersela, 14 gg e se non presenta allergie sostituirla con Cardioaspirin 100 mg 1 cp/die che va sospeso 5 gg prima.
- **ACIDO ACETILSALICILICO (Aspirina):** sospendere 5 giorni prima
- **COUMADIN o SINTROM:** sospendere 7 giorni prima e sostituire con SELEPARINA 0,4 ml 1 fiala sottocute (l'ultima somministrazione deve essere effettuata 24 ore prima). In caso di alto rischio trombo-embolico, secondo il dosaggio concordato con lo specialista di riferimento, per l'esecuzione dell'esame, l'ultima somministrazione deve essere effettuata al massimo 12 ore prima.
- **NAO:** Apixaban (Eliquis), Dabigatran Etextilato (Lixiana), Edoxaban (Pradaxa), Idarucizumab (Praxbind), Rivaroxaban (Xarelto), sospendere 48 ore prima.

Nei casi di pazienti in terapia con Coumadin, Sintrom o NAO, il controllo del PT e PTT deve essere effettuato il giorno prima della biopsia.

Il paziente affetto da condizioni cardiache a rischio di sviluppare endocardite batterica, oltre alla profilassi specifica per la procedura, deve seguire lo schema di profilassi a pag. 2.

In caso di mancata esecuzione delle istruzioni sotto-riportate, l'esame dovrà essere necessariamente posticipato.

1. La SERA PRECEDENTE all'esame, assumere una cena leggera ed eseguire un microclisma evacuativo di pulizia. Assumere 1 busta di antibiotico FOSFOMICINA 3g (prima di coricarsi e dopo aver vuotato la vescica).

2. Il GIORNO DELL'ESAME assumere una colazione leggera. Ripetere a domicilio il microclisma evacuativo. Assumere 1 busta di antibiotico FOSFOMICINA 3g (3 ore prima dell'esecuzione dell'esame).

DIPARTIMENTO DI DAY SURGERY

Responsabile Dr. Pasquale Piazzolla

DIPARTIMENTO DI U.F. UROLOGIA

Responsabile Dr. Carmelo Morana

Tel. 0422 896722

ISTRUZIONI PER L' ESECUZIONE DI AGOBIOPSIA PROSTATICA TRANS-RETTALE ECOGUIDATA

Presentarsi all'ora indicata, presso l'Ufficio Cassa muniti di:

PRESTAZIONE IN REGIME SSN**n. 1** ricetta SSN del Medico Curante con la dicitura**- cod. 60.11 agobiopsia ecoguidata della prostata (nel campo "prescrizione")****- n. 1 (nel campo "quantità")****n. 1** ricetta SSN del Medico Curante con la dicitura**- cod. 91. 44.1 esame istologico di biopsia prostatica (nel campo "prescrizione")****- n. 8 (nel campo "quantità")****PRESTAZIONE IN REGIME LIBERA PROFESSIONE**

Richiesta dello Specialista con la seguente dicitura:

agobiopsia ecoguidata della prostata**+ esame istologico di biopsia prostatica**

Si ricorda di portare con sé:

Gli esami ematochimici prescritti**Una bottiglia di acqua (almeno 1,5 l.) al fine di iniziare l'assunzione di abbondanti liquidi sin dall'esecuzione dell'esame e proseguire per i successivi 3 giorni (almeno 2 litri /al giorno)****PER I DUE GIORNI SUCCESSIVI ALL'ESAME****Assumere 1 busta di antibiotico FOSFOMICINA 3 g la sera a vescica vuota.**

Dopo la biopsia è consigliabile riposo per 48 ore.

Se non si verificano complicazioni il paziente potrà tornare alle consuete attività dopo due giorni. In caso di sanguinamento profuso, febbre elevata (maggiore di 38°C), difficoltà ad urinare o per qualsiasi necessità telefonare al numero **0422896562** (infermieri ambulatori) dalle 08.00 alle 12.30 (dal lunedì al venerdì) o al n. **0422896722** (reparto di Chirurgia/Urologia).**PROFILASSI DELL'ENDOCARDITE BATTERICA**

Per i pazienti affetti dalle patologie cardiache di seguito elencate sottoposti a determinate procedure tra le quali la biopsia prostatica, è raccomandata la profilassi antibiotica per la prevenzione dell'endocardite batterica come da schema indicato:

Pazienti a rischio elevato di endocardite ➔

(pregressa endocardite, portatori di protesi valvolari cardiache, cardiopatie congenite complesse- tetralogia di Fallot e altre forme cianogene complesse, difetto interventricolare, stenosi aortica congenita, bicuspidia aortica.

Amoxicillina (o ampicillina) 2 g ev + gentamicina 3 mg/Kg im o ev 30 min/1 ora prima della procedura.

Dopo 6 ore Amoxicillina (o ampicillina) 1 g. x os e proseguire con 1 gr x 2 al dì per 3 gg.

Nei soggetti allergici Clindamicina 600 mg. 1-2 ore prima della procedura +gentamicina 3 mg/Kg ev o im

Pazienti a rischio moderato di endocardite ➔

Valvulopatie acquisite (malattia reumatica, valvulopatia aortica, insufficienza mitralica), prollasso mitralico con ispessimento, calcificazione o degenerazione mixomatosa dei lembi, insufficienza valvolare, cardiopatie congenite non cianogene, cardiomiopatia ipertrofica

Amoxicillina (o ampicillina) 2 g ev entro 30 min/1 ora prima della procedura, o per via orale 1 g X 2 al dì iniziando 24 ore prima della procedura e proseguendo per 3 giorni.

Nei soggetti allergici, Clindamicina 600 mg. 1-2 ore prima della procedura ev o im

In caso di impossibilità a sottoporsi all'indagine si prega di dare comunicazione di disdetta con preavviso di almeno 48 ore dalla data dell'appuntamento, telefonando ai numeri indicati nel foglio della prenotazione.