

**ISTRUZIONI PER L'ESECUZIONE DI  
AGOBIOPSIA PROSTATICA TRANS-RETTALE ECOGUIDATA**

**Per il medico curante e per il paziente  
IL PAZIENTE È INVITATO AD ATTENERSI SCRUPOLOSAMENTE ALLE  
NORME SOTTORIPORTATE**

La biopsia prostatica viene eseguita in regime ambulatoriale. È preferibile la presenza di un accompagnatore per l'eventuale impossibilità alla guida di veicoli nelle ore successive all'indagine.

**Segnalare sempre all'Urologo eventuali allergie a farmaci, anestetici locali, lattice e l'eventuale assunzione di farmaci antiaggreganti o anticoagulanti che diminuiscono la capacità di coagulazione del sangue (es. Aspirina, Tiklid, Persantin, Eparina, Coumadin, Sintrom, etc.)**

**Il paziente in trattamento anticoagulante o antiaggregante (Coumadin, Aspirina ecc.) dovrà sospendere la terapia secondo le indicazioni del centro di riferimento o seguendo il seguente schema:**

- **terapia con TICLOPIDINA:** sospenderla, 14 gg e se non presenta allergie sostituirla con Cardioaspirin 100 mg 1 cp/die che va sospeso 5 gg prima.
- **ACIDO ACETILSALICILICO (Aspirina):** sospendere 5 giorni prima
- **terapia con COUMADIN o SINTROM:** sospendere 7 giorni prima e sostituire con SELEPARINA 0,4 ml 1 fiala sottocute (l'ultima somministrazione deve essere effettuata 24 ore prima).

**Il paziente affetto da condizioni cardiache a rischio di sviluppare endocardite batterica, oltre alla profilassi specifica per la procedura, deve seguire lo schema di profilassi a pag. 2.**

**In caso di mancata esecuzione delle istruzioni sotto-riportate, l'esame dovrà essere necessariamente posticipato.**

**1. La SERA PRECEDENTE all'esame, assumere una cena leggera ed eseguire un microclisma evacuativo di pulizia. Assumere 1 compressa di antibiotico LEVOFLOXACINA 500 mg.**

**2. Il GIORNO DELL'ESAME assumere una colazione a base di soli liquidi (the, latte, ecc.). Ripetere a domicilio il microclisma evacuativo. Assumere 1 compressa di antibiotico LEVOFLOXACINA 500 mg.**

Presentarsi all'ora indicata, presso l'Ufficio Cassa muniti di:

PRESTAZIONE IN REGIME SSN	PRESTAZIONE IN REGIME LIBERA PROFESSIONE
n. 1 ricetta SSN del Medico Curante con la dicitura - <b>campo prescrizione: cod. 60.11 agobiopsia ecoguidata della prostata</b>	Richiesta dello Specialista con la seguente dicitura: <b>agobiopsia ecoguidata della prostata + esame istologico di biopsia prostatica</b>
n. 1 ricetta SSN del Medico Curante con la dicitura - <b>campo prescrizione: cod. 91. 44.1 esame istologico di biopsia prostatica</b> - <b>campo quantità: 8</b>	

**ISTRUZIONI PER L'ESECUZIONE DI  
AGOBIOPSIA PROSTATICA TRANS-RETTALE ECOGUIDATA**

Si ricorda di portare con sé:

1. **l'esito dei seguenti ESAMI EMATOCHIMICI recenti (eseguiti al massimo 15 giorni prima della biopsia):**
  - **Emocromo**
  - **PT (tempo di protrombina o tempo di Quick)**
  - **PTT (tempo di tromboplastina parziale)**
  - **PSA (antigene prostatico specifico) - ultimo controllo eseguito**

Nei casi di pazienti in terapia con Coumadin o Sintrom, il controllo del PT e PTT deve essere effettuato il giorno prima della biopsia.

**2. Una bottiglia di acqua (almeno 1,5 l.) al fine di iniziare l'assunzione di abbondanti liquidi sin dall'esecuzione dell'esame e proseguire per i successivi 3 giorni (almeno 2 litri /al giorno)**

**3. PER I TRE GIORNI SUCCESSIVI ALL'ESAME**

**Assumere 1 compressa di antibiotico LEVOFLOXACINA 500 mg al giorno.**

Dopo la biopsia è consigliabile riposo per 48 ore.

Se non si verificano complicazioni il paziente potrà tornare alle consuete attività dopo due giorni.

In caso di sanguinamento profuso, febbre elevata (maggiore di 38°C), difficoltà ad urinare e in ogni caso di necessità telefonare al n. **0422896562** (Infermiere Danila e Maria Teresa) dalle 08.00 alle 12.30 (dal lunedì al venerdì) o al n. **0422896722** (reparto di Chirurgia/Urologia).

**PROFILASSI DELL'ENDOCARDITE BATTERICA**

Per i pazienti affetti dalle patologie cardiache di seguito elencate sottoposti a determinate procedure tra le quali la biopsia prostatica, è raccomandata la profilassi antibiotica per la prevenzione dell'endocardite batterica come da schema indicato:

<p><b>Pazienti a rischio elevato di endocardite</b> (pregressa endocardite, portatori di protesi valvolari cardiache, cardiopatie congenite complesse-tetralogia di Fallot e altre forme cianogene complesse, difetto interventricolare, stenosi aortica congenita, bicuspidia aortica.)</p>	<p>Amoxicillina (o ampicillina) 2 g ev + gentamicina 3 mg/kg im o ev 30 min./1 ora prima della procedura. Dopo 6 ore Amoxicillina (o ampicillina) 1 g. X os Nei soggetti allergici Clindamicina 600 mg. 1-2 ore prima della procedura + Gentamicina 3 mg/Kg e.v. o i.m.</p>
<p><b>Pazienti a rischio moderato/ lieve di endocardite</b> valvulopatie acquisite (malattia reumatica, valvulopatia aortica, insufficienza mitralica), prollasso mitralico con ispessimento, calcificazione o degenerazione mixomatosa dei lembi, insufficienza valvolare, cardiopatie congenite non cianogene, cardiomiopatia ipertrofica</p>	<p>Amoxicillina (o ampicillina) 2 g ev entro 30 min./ 1 ora prima della procedura, o per via orale 1 ora prima della procedura Nei soggetti allergici Clindamicina 600 mg. 1-2 ore prima della procedura e.v. o i.m.</p>